马蹄莲的养殖方法

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：https://www.xiaorob.com/zhuanti/yuedu/2681.html

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

马蹄莲的养殖方法

总结精选（1）：

马蹄莲的养殖方法(基本知识)：

最佳生长温度：马蹄莲的生长最适温度为22～30°C。温度低于20°C以下，马蹄生长速度会变缓慢。甚至会停止生长。马蹄莲喜欢温暖、湿润的环境，因此过冬时，要特注意给马蹄莲保暖。避免温室中的温度过高，个性是相对湿度大时。

生长湿度要求：马蹄莲喜湿润、肥沃土壤。

最佳生长土壤：马蹄莲养殖时土壤以沙壤土为主配以园土和腐叶各1/3，再掺入1/5有机肥。因其根系长在球体上部，所以盆土底层要垫透水透气的炉渣或粗粒沙。再配上三分之一的园土和腐叶。并加入少量的有机肥。

最佳生长光照：马蹄莲开花期要注意光照，马蹄莲“喜长光而不喜强光”，尤其是夏季最忌烈日直射。所以要放在光线充足的地方，夏季可移到距窗较远处。马蹄莲花期光照不足，就会只抽苞而不开花，甚至花苞逐渐变绿而干瘪。春秋季不必遮光。

最佳繁殖时间：马蹄莲在6～7月进入休眠期，这时能够取下成熟植株周围的球茎进行养殖新的盆栽。最适合养殖的季节为8～9月。分株繁殖必须要在秋季，否则当年很难开花，就是开花，花期也晚。

养殖马蹄莲的心得：

1、马蹄莲对“烟”的厌恶：马蹄莲对“烟”较敏感。炉灶烟、抽烟都会使马蹄莲黄叶、落花，生长不良。

2、浇水：带给足够的水分（不要种植的太浅；当土壤变干时再浇水）。

3、排水：土壤的排水性能要好，以防止过湿状况的发生。

4、防止植株和块茎受损伤：防止风对植株的损伤，注意不要让除草剂影响植株的生长，在收获

和处理时的操作要留意。

5、防止真菌病害和虫害：例如由腐霉菌或丝核菌引起的损伤可能为欧氏菌的侵入带给一个港口。

总结精选（2）：

彩色马蹄莲的养殖方法

1、温度：彩色马蹄莲的生长适宜温度为15°C-25°C，开花的时候，日间的温度应为16°C-19°C。若温度高于25°C或低于5°C，彩色马蹄莲植株会被迫进入休眠。彩色马蹄莲的花期主要受温度光照的影响，透过控制温度光照能够周年供花。

2、土壤：养殖彩色马蹄莲宜选取排水条件较好，富内含机质，pH值在7左右的沙质土壤，并施入氮、磷、钾和超多腐熟有机肥料。

3、浇水：养殖彩色马蹄性喜阳光充足和温暖湿润的环境，不耐寒冷和干旱，一般状况是生长初期宜湿。马蹄莲植株开完花后，浇水量要逐渐减少，叶变黄枯萎时，要完全停止浇水。

4、光照：彩色马蹄莲喜欢阳光，冬季需要充足的光照，夏季避免阳光直晒。

5、施肥：彩色马蹄莲生长季节，每半月施稀薄液肥一次，当花莛抽出后，要增加到每周一次，直到彩色马蹄莲花期结束为止。

彩色马蹄莲养殖注意事项

彩色马蹄莲植株花谢以后，应逐渐减少浇水量，至4月下旬搬至室外，放置在略有蔽荫处养护，每一天浇水一次，并向花盆附近地面洒水，以增加空气湿度。

6月以后，彩色马蹄莲叶片逐渐枯黄进入休眠期，这时需要剪掉枯叶，控制浇水，停止施肥，将花盆搬到通风凉爽处，促使彩色马蹄莲进入休眠期。

到秋季天气转凉后，再将彩色马蹄莲块茎从花盆内倒出，取出大的块茎，用新鲜肥沃的培养土重新种植彩色马蹄莲，待块茎萌发出叶时，再逐渐增加浇水量，同时恢复施肥，便能够让马蹄莲继续开花。

彩色马蹄莲繁殖方法

1、分株

主花期过后或休眠期过后，将丛生的健壮母株的块茎挖出，根据原块茎大小及芽点多少，把一丛切分成2-3丛（每丛要带2-3个芽点），另行栽种，正常管理，3个月即可开花。

2、子球

把休眠期块茎挖出，正常分株后，还可切下一些较小的块茎。这些小块茎要露地栽培1-2年才能

做开花球。秋季封冻前，整地做床，用普通园土栽培子球，子球生长慢，如改用培养基质，则大部分子球当年即可构成开花球。培养基质用珍珠岩（或粗沙）、腐殖土和泥炭各1份。此外，种植子球时，每100m2培养床要施入磷酸二铵10Kg，硫酸亚铁1Kg。高床或低床均可。早春，土壤解冻后，尽早栽培种球。1cm以上子球栽植密度为10cm×10cm，深度为5cm，小于1cm子球可撒播，密度在5cm×5cm左右即可，覆土深度2-3cm。

栽培后要及时灌水，保证充足的水分供应，植株进入旺盛生长期时要追施化肥，每10-15d一次，应按氮、磷、钾1:1:1的完全肥料配成0.5%的水溶液。子球亦有高温休眠习性，休眠期要减少甚至停止水肥供应。也可采用遮光率为30%-50%的遮阳网降温，或用松针和阔叶树落叶等覆盖物降低土温，保证较长的生长季，有利于子球长大。生长期如有花茎出现，应及早除掉，使养分集中，供块茎生长。至秋季或盛夏高热季，地上部分干枯时，起球分级贮藏。

3、播种

马蹄莲可播种繁殖，但因自然结实率较低，种子不易采到，如播种繁殖，可选留健壮母株，人工辅助授粉，种子成熟后即可采收。采后即播，发芽适温20°C左右，4周左右幼芽出土，2-3片真叶时移植。在优良的栽培管理条件下，二年能养成开花球。

4、组培

马蹄莲组培繁殖应用的外植体为嫩叶及带芽点块茎。培养条件：光照度1000-1500lx，光照时间为12-16h，温度15-25°C。诱导培养基：MS+BA1mg/L+NAA0.1mg/L继代培养基：MS+BA5-10mg/L+NAA0.2-0.5mg/L生根培养基：1/2MS+IBA1-2mg/L当组培苗根系长到1-2cm时，打开瓶口炼苗2-3d后上盆，基质用充分消毒过的珍珠岩和草炭土1:1混合物。然后将盆放在塑料棚下保湿（相对湿度90%-100%）、保温（温度20°C左右）7d后去覆盖物，正常养护，1年左右，小苗可开花。

养殖马蹄莲的注意事项：

施撒肥料：马蹄莲生长过程中缺肥或施肥过量都会引起黄叶，所以要注意施基肥(马蹄片最好)。盆栽养分有限，所以要薄肥勤施，不断补充盆土养分。

繁殖要点：马蹄莲繁殖以分球繁殖为主。植株进入休眠期后，剥下块茎四周的小球，另行栽植。也可播种繁殖，种子成熟后即行盆播。发芽适温20°C左右。

分株：当5～6月花后，老叶逐渐枯萎，并长出新叶时或9月中旬换盆时，将母株周围的小块茎剥下，分级上盆。一般栽植后3个月开花。

播种：以室内盆播为主，发芽适温为18～24°C，播后15～20天发芽，实生苗需培育3～4年才能开花。

修剪要领：马蹄莲属多年生草本植物，一年中可多次开花。勤将老叶剪除能够促使其多次开花。

盆土更换：马蹄莲在6月下旬至8月上旬，结合换盆，将发育良好的大形分株带根用手掰开（最好不用刀），植于准备好的盆中。如用做切花，可多植2至3个分株，栽后置于阴凉处。采用此方法繁殖，当年9～10月份就可开花。

浇水要点：马蹄莲有“ 浇不死的马蹄莲 ”之说，因为它喜欢温暖湿润的环境，不耐干旱，所以盆土要持续湿润，不能缺水。环境如果干燥，要向地面喷水，持续一个湿润的小环境。在生长、开花期应充分浇水。持续盆土湿润，但花后应减少浇水量，以利休眠。

病虫防治：马蹄莲块茎在休眠期或贮藏过程中易发生腐烂病，可用抗菌剂401醋酸溶液1000倍液喷洒块茎表面，晾干后贮藏。虫害有红蜘蛛和蓟马危害，分别用50%乙酯杀螨醇1000倍液和2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液喷杀。

总结精选（3）：

一、了解马蹄莲的生长习性

性喜温暖气候，不耐寒，不耐高温，生长适温为20°C左右，0°C时根茎就会受冻死亡。冬季需要充足的日照，光线不足着花少，稍耐阴。夏季阳光过于强烈灼热时适当进行遮荫。喜潮湿，稍有积水也不太影响生长，但不耐干旱。喜疏松肥沃、腐殖质丰富的粘壤土。

二、马蹄莲的繁殖方法有哪些

繁殖以分球繁殖为主。植株进入休眠期后，剥下块茎四周的小球，另行栽植。也可播种繁殖，种子成熟后即行盆播。发芽适温20°C左右。

三、马蹄莲如何养殖

1、花盆和土壤的选取

花盆宜选用浅盆，不要用筒子盆。养花土壤以沙壤土为主配以园土和腐叶各1/3，再掺入1/5有机肥。因其根系长在球体上部，所以盆土底层要垫透水透气的炉渣或粗粒沙。

2、马蹄莲的施肥技巧

生长过程中缺肥或施肥过量都会引起黄叶，所以要注意施基肥(马蹄片最好)。盆栽养分有限，所以要薄肥勤施，不断补充盆土养分。

3、上盆

待块茎萌发新叶时，再选用肥大、健壮块茎上盆，10月以后置于温室养护，春节前后即能开花。但需防止通风不良和室温太高。

4、马蹄莲对水的需求

马蹄莲有“ 浇不死的马蹄莲 ”之说，因为它喜欢温暖湿润的环境，不耐干旱，所以盆土要持续湿润，不能缺水。环境如果干燥，要向地面喷水，持续一个湿润的小环境。在生长、开花期应充分浇水。持续盆土湿润，但花后应减少浇水量，以利休眠。

5、马蹄莲对光照的需求

开花期要注意光照，马蹄莲“喜长光而不喜强光”，尤其是夏季最忌烈日直射。所以要放在光线充足的地方，夏季可移到距窗较远处。马蹄莲花期光照不足，就会只抽苞而不开花，甚至花苞逐渐变绿而干瘪。春秋季不必遮光。

四、养殖马蹄莲的注意事项

1、修剪：马蹄莲属多年生草本植物，一年中可多次开花。勤将老叶剪除能够促使其多次开花；

2、马蹄莲对“烟”的厌恶：马蹄莲对“烟”较敏感。炉灶烟、抽烟都会使马蹄莲黄叶、落花，生长不良。；

3、浇水：带给足够的水分（不要种植的太浅；当土壤变干时再浇水）；

4、排水：土壤的排水性能要好，以防止过湿状况的发生；

5、温度：避免温室中的温度过高，个性是相对湿度大时；

6、防止植株和块茎受损伤：防止风对植株的损伤，注意不要让除草剂影响植株的生长，在收获和处理时的操作要留意；

7、防止真菌病害和虫害：例如由腐霉菌或丝核菌引起的损伤可能为欧氏菌的侵入带给一个港口。

五、选取地栽马蹄莲怎样做

应选取肥沃湿润的土壤，施足基肥，作成1米宽的畦，将无病块茎按照行距50厘米，株距30厘米～40厘米定植，定植时间根据鲜花上市的`要求确定，一般4～6月间较好。定植后为使生育良好，自6月下旬至8月下旬应用遮阳网遮光50%～60%，在夏季地温太高时应充分灌水，由于水质和灌水量对定植后生育的影响很大，要个性注意，以低EC值、以PH6．5～PH7．0为好。追肥以氮素肥料为主，一般每15天左右施一次液肥，花期则要停止施肥。日照的长短虽然对花芽分化和发育没有影响，但长期在遮阳条件下其营养生长和生殖生长会失去平衡，所以最迟到9月上旬即要撤除遮阳网，10月开始大棚覆薄膜，冬季温度持续在15C以上，并给以充足光照，即能令其冬季开花应市。

总结精选（4）：

马蹄莲的养殖方法之马蹄莲介绍

马蹄莲为多年生草本。属天南星科的球根花卉，马蹄莲属，为新兴花卉之一。由于马蹄莲叶片翠绿，花苞片洁白硕大，宛如马蹄，形状奇特，是国内外重要的切花花卉。

马蹄莲的养殖方法之浇水

马蹄莲如果浇水过少，叶柄就会因失去水分而折断；水量过大，又会烂根。马蹄莲的养殖方法生长期间要经常持续盆土湿润，还需经常浇水，并且早、晚用水喷洒花盆周围地面，以持续叶片新鲜清洁。

马蹄莲的养殖方法之花期调节

马蹄莲促成栽培比较容易。马蹄莲的养殖方法需元旦、春节开花，可于8-9月栽植，加强护理，萌发后，每周追肥1次，持续15°C以上，置于阳光充足处即可如期开花。

马蹄莲的养殖方法之施肥

施肥少，营养不足，叶片会变黄、肥量过大，又会引起黄叶。因此，肥水要适量。马蹄莲的养殖方法除栽植前施基肥外，生长期内，每隔20天左右追施1次肥液。肥料可用腐熟的豆饼肥水，生长旺季可每隔10天左右增施1次氮磷钾混合的稀薄肥液。马蹄莲的养殖方法施肥时切忌将肥水浇入叶鞘内，以免引起腐烂。

马蹄莲的养殖方法之繁殖

以分球繁殖为主，休眠期剥离块茎四周小球另行分栽即可。马蹄莲的养殖方法种子成熟宜随采随播，约经2-3年可开花。

马蹄莲的养殖方法之温度、光照

出芽后移至阴棚下有散射光处养护，注意不要直接日晒，也不可全部阴蔽。马蹄莲宜半阴和空气湿润，马蹄莲的养殖方法夏季如不采取降温增湿和防止强光照射等措施，最易出现叶色变黄或萎蔫的现象。

马蹄莲的养殖方法之栽植

马蹄莲为盆栽观叶兼观花花卉，也是重要的切花材料。马蹄莲的养殖方法盆栽时，宜选取排水良好、肥沃的沙质壤土，并施以从分腐熟的饼肥、猪厩肥为好。马蹄莲的养殖方法于早春第1次开花后（或秋季），挖取母株根茎四周萌发的芽球，单独栽人盆中。栽好后，浇足水，放遮阴处，持续盆土湿润。

总结精选（5）：

马蹄莲的养殖方法

一、温度：马蹄莲喜欢半阴的环境，避免在强光下放置。马蹄莲的生长最适温度为22-30度。温度低于20度以下，马蹄生长速度会变缓慢。甚至会停止生长。马蹄莲喜欢温暖、湿润的环境，因此过冬时，要特注意给马蹄莲保暖。

二、土壤：养殖马蹄莲的盆土适宜选取透气排水良好的沙质酸性土壤。盆土底层最好垫一层粗沙粒有利于马蹄莲的生长，再配上三分之一的园土和腐叶。并加入少量的有机肥。栽种马蹄莲的盆子最好选取浅盆。

三、浇水：与其它盆土植物类似，给马蹄莲浇水需要要据盆土的干燥状况来浇水。浇水之前先看下盆土的状况。平时能够在盆土表面和花表面喷水，持续盆土湿润。马蹄莲生长期间喜水分充足，要经常向叶面、地面洒水，并注意叶面清洁。

四、施肥：磷钾肥是是适合用来给马蹄莲施肥用的肥料。肥沃的土壤有利于马蹄莲的生长，因此要勤施薄肥，以保证盆土有足够的养料。想留种的花主推荐在马蹄莲结果后，每10天一次给马蹄莲喷施磷酸二氢钾溶液，浓度0.1%至0.2%。

五、光照：从马蹄莲的自身状况来说，马蹄莲在生长的过程中是较为喜欢温暖避阴的环境，但要注意处于不同生长时期的马蹄莲对光照的要求存在不同。在马蹄莲处于生长阶段较耐阴。而当其处于生长旺盛期则需要丰盛的光照条件。开花时尤其是。对于马蹄莲光照及温度护理，要注意马蹄莲在开始生长阶段较耐阴蔽;进入生长旺盛阶段要求光照充足;到了开花时期更需要有充足的光照，开花期，如果光照不足的话，容易造成花苞变绿或者一向是含苞就是不开花的状态。

六、繁殖：马蹄莲能够透过种子进行繁殖，在20度的室温下种子会发芽。。也能够透过球茎进行繁殖。当马蹄进入休眠期后，能够剥下植株周围的小球重新栽植。约经2-3年可开花。出芽后移至阴棚下有散射光处养护，注意不要直接日晒，也不可全部阴蔽。马蹄莲宜半阴和空气湿润，夏季如不采取降温增湿和防止强光照射等措施，最易出现叶色变黄。或萎蔫的现象。

七、病虫防治：马蹄莲在生长季节通风不良时，最易发生蚜虫危害。发生虫害时可喷洒40%氧化乐果乳剂1500-2000倍液防治，并注意改善通风条件。

养殖马蹄莲的过程中需要了解的一些问题。

1.施肥要适量：在生长期内每隔20天要给马蹄进行施肥一次。肥料选用腐熟的豆饼水。生长旺季就要多施薄肥，每10天一次。以氮磷钾肥液进行给马蹄莲施加。必须要避免从肥水从叶鞘倒入，会引起马蹄莲腐烂。施肥较少可能会引起叶片营养不良泛黄。肥量太多，也会造成马蹄莲出现黄叶片。施肥后要用清水进行清洗。

2.马蹄莲的种植季节：马蹄莲在6-7月进入休眠期，这时能够取下成熟植株周围的球茎进行养殖新的盆栽。最适合养殖的季节为8-9月。分株繁殖必须要在秋季，否则当年很难开花，就是开花，花期也晚。

3.马蹄莲什么时候开花：2-4月是马蹄莲开花的季节。要注意给予充足的光照才能开出纯正的健康花朵。

4.马蹄莲的毒性：马蹄莲花有毒，内含超多草本钙结晶和生物碱，误食会引起昏眠等中毒症状。该物种为中国植物图谱数据库收录的无毒植物，其毒性为块茎、佛焰苞和肉穗花序有毒。咀嚼一小块块茎可引起舌喉肿痛。同时马蹄莲可药用，具有清热解毒的功效。治烫伤，鲜马蹄莲块茎适量，捣烂外敷。预防破伤风，在创伤处，用马蹄莲块茎捣烂外敷。马蹄莲有毒，禁忌内服。

5.马蹄莲处于休眠期：花期结束后，马蹄莲将进入休眠期，此时要减少浇水量，尤其是在5月以后植株开始枯黄，室应注意通风并持续干燥，以防块茎腐烂。待植株完全休眠时，可将块茎取出，晾干后贮藏，秋季再行栽植。

更多 经典阅读 请访问 https://www.xiaorob.com/zhuanti/yuedu/

文章生成PDF付费下载功能，由ECMS帝国之家开发