

风信子开花后怎么处理

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://www.xiaorob.com/zhuanti/yuedu/937.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

风信子开花后怎么处理

总结精选（1）：

风信子开花后怎样处理？

风信子开花后不像一般的花一样，能够收获种子，风信子开花后就将它的花茎剪去，这样就能促进球根的发育，剪的位置也是比较重要的，您要剪花茎的最上面的部分。

如果您想要风信子繁殖的话，就能够将风信子的球根挖出，储藏在冷库里面，来年来拿出来种植，这样就能繁殖出更多的风信子了。相信很多人都感觉这样的保存方式很神奇，不相信风信子需要这样的环境下才能真正的成长。但是您完全不需要惊讶，事实就是要这样才能长出更多的风信子，风信子才能繁殖出更多，不然永久只会是一株，凋谢了再重买。其实每种植物都有自己独特的个性，相信很多爱花的人都是尊重每一种花的生长过程的，花的生长就是生命，我们要尊重每个生命。

其实种植风信子和其他的花是一样的，只要真心对待，风信子一样会开出秀丽的花朵作为报答，给您带来心灵的震撼，如果您种植了风信子，并且十分喜欢它就不要随意的践踏它，要真心的对待，及时的浇水，换水，茎叶也要及时的修剪。在风信子开花后，要耐心的进行处理，这样才能保证风信子的正常的生长。既然养殖了风信子，就要根据它的习性进行正确的调整，不能三心二意，也不能有偏心，对其他花更加好一点，到了来年要及时的进行种植，让它繁衍。

风信子开花后怎样处理

怎样处理开花后的风信子才能保证来年开花？下面就是基本步骤。

土培风信子：

开花后叶片会慢慢枯萎，剪去枯叶，把鳞茎挖出，置阴凉干燥处，7月中旬高温时，可放于冰箱中，以防腐烂。

9月底取出，栽入盛有普通培养土的盆中，盆底放几粒复合肥，然后置于阳台上，使其经过至少5-7周的自然低温，此间持续盆土潮润，在距春节30-40天时冰进室内光照充足处，经常浇水，使盆土湿润而不积水。

室温最好在20度左右，温度高时要适当多浇水，低时要设法增温，这样到春节又可开花。

水培风信子：

风信子开花后继续水养直到6月初气温逐渐升高，风信子的叶子会变得枯黄进入夏眠状态。

将夏眠状态的风信子枯黄叶子及根系全部剪掉，把风信子的球根放在阴凉通风处一至两天避免太阳晒，待彻底晾干

将球根包裹住放入罐中放入冰箱冷藏室，以防腐烂。

待到11月天气逐渐转凉时，将球根取出放在完全黑暗且冷凉处，约5度左右促使发根，约25天就会萌生根系，待根系长至2厘米左右即可按正常养殖的方法进行养殖。

总结精选（2）：

水培风信子花谢的处理方法：

- 1、剪除叶片：将夏眠期风信子枯黄的叶片全部剪除，并剪去所有的根系。
- 2、继续水养：水培风信子花谢后的风信子继续水养，直到6月初气温逐渐升高时，风信子的叶片会枯黄并进入夏眠期。
- 3、温度要求：度夏期间温度不能超过10度，否则球根易腐烂。
- 4、冷藏风信子：将球根放在阴凉通风处晾1至2天(千万不能晒)。待彻底晾干后将球根用报纸包裹好放入罐中，放在冰箱的冷藏室(不是冷冻室)里。
- 5、重新养殖：待到11月份气温逐渐转凉进入深秋时，将保存了一个夏天的风信子球根取出，放在恰当容器的瓶口上，加水至距离球根底部约1CM处，然后放在完全黑暗且冷凉处5 促使发根。约经25天会萌生根系，待根系长至2CM时，就可按照正常的风信子养护方法来养直至开花了。一般这样循环，风信子能够养到3年左右，第4年时原先的球根基本上就不会再开花了。

土培风信子花谢的处理方法：

- 1、保留球茎：土培风信子花谢后。将叶片，花茎等全部剪掉，保留球茎。然后把球根埋到沙土里面，等待夏天的休眠期到来。
- 2、重新养殖：7月20日左右，挖出来，放进冰箱的冷藏室，持续在4℃，进行低温催芽，等生长点萌芽后，继续埋到沙土里面，15天浇水一次，等待12月份上盆栽培，管理很粗放，并没有什么特殊的技术。

小知识：

风信子开花后，经过处理，次年也会开花，但花会变得矮小，花萼也萎缩，这主要是鳞茎已退化状。因此，风信子栽培以一年种植后再买新的鳞茎为宜！

总结精选（3）：

风信子开花后怎样处理绝对最正确的处理方法

一、风信子什么时候开花

(1)水养。可在12月份将种头放在阔口有格的玻璃瓶内，加入少许木炭以帮忙消毒和防腐。其种头仅浸至球底便可，然后放置到阴暗的地方，并用黑布遮住瓶子。这样经过20多天后根部便在全黑的环境下萌发出来，这时可拿出室外让它理解阳光照射。初时每一天照一两个小时，再逐步增至七八个小时，如果天气变化不大的话，到春节便有可能开花了。

(2)盆栽。即在10月份时将种头种入有培养土的盆内，每小盆种1球，大盆种3~4球然后盖土，种后要注意增施磷、钾肥。经过120天左右将可开花。

二、风信子开花后怎样处理

(1)如果你不打算明年再种的话，就不用管它了。

(2) 水培风信子开花后怎样处理：

- 1、继续水养：水培风信子花谢后的风信子继续水养，直到6月初气温逐渐升高时，风信子的叶片会枯黄并进入夏眠期。
- 2、剪除叶片：将夏眠期风信子枯黄的叶片全部剪除，并剪去所有的根系。
- 3、冷藏风信子：将球根放在阴凉通风处晾1至2天(千万不能晒)。待彻底晾干后将球根用报纸包裹好放入罐中，放在冰箱的冷藏室(不是冷冻室)里。
- 4、温度要求：度夏期间温度不能超过10度，否则球根易腐烂。
- 5、重新养殖：待到11月份气温逐渐转凉进入深秋时，将保存了一个夏天的风信子球根取出，放在恰当容器的瓶口上，水加至距离球根底部约1CM处，然后放在完全黑暗且冷凉处5 促使发根。约经25天会萌生根系，待根系长至2CM时，就可按照正常的风信子养护方法来养直至开花了。一般这样循环，风信子能够养到3年左右，第4年时原先的球根基本上就不会再开花了。

(3) 土培风信子开花后怎样处理：

- 1、保留球茎：土培风信子花谢后。将叶片，花茎等全部剪掉，保留球茎。然后把球根埋到沙土里面，等待夏天的休眠期到来。
- 2、重新养殖：7月20日左右，挖出来，放进冰箱的冷藏室，持续在4℃，进行低温催芽，等生长点萌芽后，继续埋到沙土里面，15天浇水一次，等待12月份上盆栽培，管理很粗放，并没有什么特殊的技术。

总结精选（4）：

风信子开花后怎样处理：

很多人因为不注意养殖方法，一般都是开一次花以后就丢弃，其实是能够年年开花的，只是每年花序都小一点，但是小到必须程度就不再退化，甚至能够长出小球顺利开花。

导致风信子退化的主要原因有两个，一个是这类植物开花后是种球膨大的最重要时期。原产地气候温和，6月以后天气才明显的热起来，而且湿度也不低。这样花谢后有2-3个月的适宜温度来生长。中国的气候5月初就热的不行，又比较干热，促使植物早早的休眠，未能充分的膨大。这是退化的主要原因。

不要把开花后的风信子丢弃了，花后及时补肥，注意叶心不能沾水，5月后放在阴凉的地方，尽可能的延缓叶片由绿转黄的过程，能够减缓退化的程度甚至不退化。即使退化了，不同色彩的风信子种在一齐也有不错的观赏效果。

总结精选（5）：

风信子开花后怎样处理？别扔掉，这样处理一下还能再开花！

风信子开花个性漂亮，还有好多种色彩好多个种类哦！红色，白色，紫色，粉色，开出来的花儿据说是会开花的植物里面最香的一种。关键它还个性好养，不管是用玻璃瓶水培，还是用花盆来种，基本毫不费力都能开出闪亮的花朵来。

那么开完花的风信子，就毫无价值能够扔掉了？千万别扔掉，因为风信子不是一年生球根草本植物，而是多年生。所以，完全能够继续种，还能够再开花哦。那么要继续种下去，该怎样做呢？

方法很简单，小雅君实验过。比喻冬天买的球根，种在花盆的土壤里，开花完之后，花朵会渐渐的枯萎，然后叶子也会枯萎，这个时候能够剪掉残花败叶，盆土不要动它，连盆带土带里面的球根放置在阳台比较阴凉的地方，我是放在飘窗下面，阳光没有直射的地方。

为了防止盆土和球的水分完全被蒸发干了，偶尔记起来也会浇点水进去。持续盆土的湿润。不要让花盆积水，不要

让它淋雨，以免风信子种球在里面泡烂了。然后到了初冬的时候，就能够拿出来，浇水，弄点有营养的含沙的土，晒太阳，等等，过不了多久，就会开花了。

但是，第二次开花，虽然没有第一次那么完美大朵，但是也很漂亮的。

【相关阅读】

风信子，别名：洋水仙，五色水仙，拉丁文名：HyacinthusorientalisL.Sp.Pl.是百合科、风信子属多年生草本植物。地下茎球形。叶厚披针形。总状花序顶生，花冠6片、反卷，常见栽培有红、黄、蓝、白、紫各色品种，具芳香味，花期3-4月。原产于南欧、非洲南部和亚西亚一带，荷兰栽培为最多。我国各地均有栽培。可用于春季布置花坛及草坪边缘的优良宿根花卉。也可盆栽、水养或切花。全世界风信子的园艺品种约有2000种以上，主要分为“荷兰种”和“罗马种”两类。前者属正宗品种，绝大多数每株只长1支花葶，体势粗壮，花朵较大。而后者则多是变异的杂种，每株能着生二三支花葶，体势幼弱，花朵较细，多数消费者喜购荷兰风信子。

百合科风信子属多年生草本植物。地下茎球形。叶厚披针形。总状花序顶生，花冠6片、反卷，常见栽培有红、黄、蓝、白、紫各色品种，具芳香味，花期3-4月。蒴果黄褐色，果期5月。

风信子习性喜阳、耐寒，适合生长在凉爽湿润的环境和疏松、肥沃的砂质土中，忌积水。喜冬季温暖湿润、夏季凉爽稍干燥、阳光充足或半阴的环境。喜肥，宜肥沃、排水良好的沙壤土。地植、盆栽、水养均可。

风信子原产于欧洲南部地中海沿岸及小亚细亚一带、荷兰，如今世界各地都有栽培。野生种生于西亚及中亚的海拔2600米以上的石灰岩地区。

荷兰是风信子的主要生产地，在十八世纪风信子的栽种十分流行，在当时有纪录的品种已经超过二千个以上。20世纪50年代开始，中国各地植物园和公园才有少量栽培，用于花坛观赏。直到80年代以后，风信子才在全国各地有较大的发展，广泛用于春季花卉展览和盆栽销售。至今，栽培风信子已开始进入家庭和公共场所的室内点缀和摆放，需求量逐年增加。但中国尚未能自行繁种，尚需从国外引进。

原产于南欧、非洲南部和亚西亚一带，荷兰栽培为最多。我国各地均有栽培。

秋季生根，早春新芽出土，3月开花，5月下旬果熟，6月上旬地上部分枯萎而进入休眠。在休眠期进行花芽分化，分化适温25℃左右，分化过程1个月左右。花芽分化后至伸长生长之前要有二个月左右的低温阶段，气温不能超过13℃。

风信子在生长过程中，鳞茎在2-6℃低温时根系生长最好。芽萌动适温为5-10℃，叶片生长适温为5-12℃，现蕾开花期以15-18℃最有利。鳞茎的贮藏温度为20-28℃，最适为25℃，对花芽分化最为理想。可耐受短时霜冻。喜凉爽、空气湿润、阳光充足的环境，较耐寒。

风信子是多年草本生球根类植物，鳞茎球形或扁球形，有膜质外皮，外被皮膜呈紫蓝色或白色等，皮膜色彩与花色成正相关。未开花时形如大蒜。叶4-9枚，狭披针形，肉质，基生，肥厚，带状披针形，具浅纵沟，绿色有光。

花茎肉质，花葶高15-45厘米，中空，端着生总状花序；小花10-20朵密生上部，多横向生长，少下垂，漏斗形，花被筒形，上部四裂，花冠漏斗状，基部花筒较长，裂片5枚。向外侧下方反卷。根据其花色，大致分为蓝色、粉红色、白色、鹅黄、紫色、黄色、绯红色、红色等八个品系。原种为浅紫色，具芳香。蒴果。花期早春，自然花期3-4月。

更多 经典阅读 请访问 <https://www.xiaorob.com/zhuanli/yuedu/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发