樱桃树几年结果

作者:小六来源:网友投稿

本文原地址:https://www.xiaorob.com/zhuanti/ziliao/2690.html

ECMS帝国之家,为帝国cms加油!

樱桃树几年结果

总结精选(1):

一、樱桃树不结果怎样回事

导致樱桃不结果的主要原因有一下几个方面

- 1、合理的修剪。
- 2、花期遇连续阴雨天气或突然低温,导致授粉受精不良。
- 3、没有授粉树,你家的樱桃是不是一个品种。
- 4、树体贮藏养分不足,导致花芽发育不良,花期落花落果严重。
- 二、樱桃树几年结果

此刻农民栽种的乔化樱桃存在着结果期晚,一般樱桃要在六年后见果,大樱桃从种植到初次结果一般来说都要三年,影响了农民种植用心性,而由毛樱桃和伏李子的嫁接的矮化缨桃,第三年一棵树就可见半公斤的果,而四五年就可有产量,这样樱桃提前丰产,就可提前给农民带来收益;另一方面,乔化樱桃由于植株高大,不但不宜棚栽,而且管理要求精细。

由毛樱桃和伏李子嫁接的矮化樱桃,植株高是乔化樱桃树的一半,树冠只在其1/3那么大,透光好,能够密植,还利于大棚栽植。这样矮化樱桃树一亩可栽植540棵,亩产可到达2500公斤,而普通的乔化樱桃树苗亩产仅为750公斤。除此之外,经过嫁接伏李子的樱桃比较皮实,好管理,能耐零下27 的低温。而且由于其独特的矮化技术,这种樱桃树还能够进行盆栽,就能够进一步提升樱桃的价值,使缨桃成为具有观赏性的高档果树。

三、樱桃树不结果怎样办

对不结果的樱桃树可反复摘心,进行叶面喷施植物生长抑制剂如多效唑,可有效控制生长势,促进植株由营养生长向生殖生长转移,从而促进花芽分化。花期可喷施硼砂溶液或者意大利进口的叶面肥--富利硼!或者用以下药剂:1、植物动力20031000倍叶面喷雾;2、0.15%皇嘉天然芸苔素乳油6000-10000倍、科宝植物优生素1500倍混合均匀叶面喷雾解救即可。

总结精选(2):

樱桃树几年结果一次

- 1、樱桃树几年结果一次,大樱桃从种植到初次结果一般来说都要三年,如果采用嫁接法这个周期这会缩短一些, 其体要根据树木的选取来定的。
- 2、中国樱桃枝条生根潜力强,大多数都是使用扦插法繁殖,这样让它的成活率一般可达80%~90%。插穗以用一年生枝为宜,于春季树液流动前扦插。插穗长15厘米~20厘米,入土2/3,然后覆土与插穗上口相平或梢高1厘米~2厘米。少量繁殖苗木时可用分株或压条法。甜樱桃须用嫁接法繁殖这样会比较适宜,如果是砧水用草樱桃(为中国樱桃中的一个类型,与甜樱桃的亲和力强),其他可用青肤樱、酸樱桃和马哈利樱桃.后两种砧木并有必须的矮化作用。

总结精选(3):

樱桃树几年开花结果?

结果最快的是大樱桃,它从种植到初次结果一般是三年,如果采用嫁接法这个周期会大大缩短,其体要根据砧木的 选取。

【相关阅读】

樱桃树蔷薇科梅属落叶小乔木,高可达8m。叶卵形至卵状椭圆形,长7~12cm,先端锐尖,基部圆形,缘有大小不等重锯齿,齿间有腺,上面无毛或微有毛,背面疏生柔毛。花白色,径约1.5~2.5cm,萼筒有毛;3~6朵簇生成总状花序。果近球形,径1~1.5cm,红色。花期3月,先叶开放;果5~6月成熟。我国栽培的樱桃可分为四大类,即中国樱桃、甜樱桃、酸樱桃和毛樱桃,以中国樱桃和甜樱桃为主要栽培对象。

樱桃或樱又名楔荆桃、车厘子等,是某些李属的植物的统称,包括樱桃亚属、酸樱桃亚属、桂樱亚属等。果实能够 作为水果食用,色泽鲜艳、晶莹秀丽、红如玛瑙,黄如凝脂,营养个性丰富,果实富含糖、蛋白质、维生素及钙、 铁、磷、钾等多种元素。主要产地山东烟台。

中国作为果树栽培的樱桃有中国樱桃、甜樱桃、酸樱桃和毛樱桃。樱桃成熟期早,有早春第一果的美誉,号称"百果第一枝"。据说黄莺个性喜好啄食这种果子,因而名为"莺桃"。其果实虽小如珍珠,但色泽红艳光洁,玲珑如 玛瑙宝石一样,味道甘甜而微酸,既可鲜食,又可腌制或作为其他菜肴食品的点缀,备受青睐。

樱桃树蔷薇科梅属落叶小乔木,高可达8m。叶卵形至卵状椭圆形,长7~12cm,先端锐尖,基部圆形,缘有大小不等重锯齿,齿间有腺,上面无毛或微有毛,背面疏生柔毛。花白色,径约1.5~2.5cm,萼筒有毛;3~6朵簇生成总状花序。果近球形,径1~1.5cm,红色。花期4月,先叶开放;果5~6月成熟。

有俗语说:"樱桃好吃树难栽",其实不是树难栽,就应说是果难摘。樱桃树的适应性相当强,几乎各种土壤都能生长;而且管理技术简便、生长快、收益早,颇能丰产;一棵大樱桃树能结果二、三百公斤,树龄能长达二百余年。但要使樱桃果结的多,质量好,就需要适宜的小气候了。如果栽得不是地方,樱桃树成活没有问题,但有可能终身"不育"——不结樱桃果;天灾和鸟灾也是果难摘的两大难。农谚云:"蚕老一时,樱熟一晌"。樱桃成熟之后,如果不立即收摘,很快会自动落地;若遇上较大的风雨,万颗红珠,便倾刻之间报了销。樱桃熟了,千万只鸟雀云集,若不拼命驱赶和赶快摘收,转眼间树冠就会由红变青,能够一颗樱桃都剩不下,所以说是果难摘。

我国栽培的樱桃可分为四大类,即中国樱桃、甜樱桃、酸樱桃和毛樱桃,以中国樱桃和甜樱桃为主要栽培对象。中国樱桃在我国分布很广,北起辽宁、南至云南、贵州、四川,西至甘肃、新疆均有种植,但以江苏、浙江、山东、北京、河北为多。东北、西北的寒冷地区种植的多为毛樱桃。中国樱桃约有五十多个品种,主要优良品种有浙江诸暨的"短柄樱桃"、山东龙口的"黄玉樱桃"、安徽太和的"金红樱桃"、江苏南京的"垂丝樱桃"、四川的"汉源樱桃"等。此外,还有辽宁、烟台等地引进的个大而甜的欧洲樱桃。但历史比较短,只有一百多年。樱桃树在一年当中,经过萌芽、开花、坐果、落叶、休眠等过程,年年周而复始,每年成为一个年轮,寿命为五十到七十年,高者可达百年以上。每年二月中旬,樱桃花与叶几乎同时萌发。开花后十余天,青青的、小小的球型果实挂满枝头,若逢天气暖热,几场春雨,几日春阳,果实转眼间就红透了。

樱桃扦插:

6月中、下旬选取3-6年生樱桃母树上当年生半木质化嫩枝和硬枝作插条。将枝条剪成12-15厘米长保留3-5节,切口要在距最上一节5厘米处平切,下剪口在节下方1-2厘米处平切,末节叶片摘除,其余保留。然后用ABTI号生根粉浓度为5Oppm溶液浸泡其基部30分钟,经处理后生根率高达97%。

樱桃树的管理

一、要注意搭配施肥

樱桃和其它植物一样,在生长发育过程中需要超多的矿质元素,如氮、磷、钾、钙、镁、铁、硼、锌等。缺少这些元素,大樱桃就不能正常生长发育,甚至出现相应的.缺素症。

二、病害树处理

对病害树的处理有: 剪除病枝,对局部枝干死亡的病树处理是;同时,将死亡的病枝同方向的根进行清理,将烂根剪掉,涂以复方多菌灵、代森锰锌(均400-600倍). 清理死树,对因病害而死亡的树进行清理,将树穴土清理出去;同时,扩穴至100cm2、深60cm、填入20cm土杂肥、20cm新土,以备来年重新植树。 检查果树枝干,将果树枝干上的虫卵块清除。

三、树体整枝整形

树体落叶后,树的枝形比较清晰,是整枝整形的理想时期。可根据生产需要,适当地拉枝。同时,将无花芽的内膛、背上枝、交叉枝从根上剪除(剪后涂漆防干缩),待摘果后,结合夏剪,去掉不需保留的内膛、背上枝等。结合根部培土,整好树盆,挖好排水沟。

四、适时浇好春水,及时喷施杀菌剂

近年来,由于冬季降雨雪较少,旱情较重,推荐对果园普浇一遍透水(结合施肥)。隔半月再浇一遍(花前水),既缓解旱情,又降低地温,以利推迟果树开花时间。并及时喷施5度石硫合剂,或1:2.5:200Be多液,对树体进行杀菌消毒。透过"涂白",也能够较好的减少树体对太阳紫外线的吸收,延缓树体升温过快,以到达推迟开花时间,使盛花期的果树能够处在较适宜的授粉气温环境中,从而提高座果率。

更多资料阅读 请访问 https://www.xiaorob.com/zhuanti/ziliao/

文章生成PDF付费下载功能,由ECMS帝国之家开发