

樱桃树几年结果

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://www.xiaorob.com/zhuanti/ziliao/987.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

樱桃树几年结果

总结精选（1）：

一、樱桃树不结果怎样回事

导致樱桃不结果的主要原因有一下几个方面

- 1、合理的修剪。
- 2、花期遇连续阴雨天气或突然低温，导致授粉受精不良。
- 3、没有授粉树，你家的樱桃是不是一个品种。
- 4、树体贮藏养分不足，导致花芽发育不良，花期落花落果严重。

二、樱桃树几年结果

此刻农民栽种的乔化樱桃存在着结果期晚，一般樱桃要在六年后见果，大樱桃从种植到初次结果一般来说都要三年，影响了农民种植用心性，而由毛樱桃和伏李子的嫁接的矮化樱桃，第三年一棵树就可见半公斤的果，而四五年就可有产量，这样樱桃提前丰产，就可提前给农民带来收益;另一方面，乔化樱桃由于植株高大，不但不宜棚栽，而且管理要求精细。

由毛樱桃和伏李子嫁接的矮化樱桃，植株高是乔化樱桃树的一半，树冠只在其1/3那么大，透光好，能够密植，还利于大棚栽植。这样矮化樱桃树一亩可栽植540棵，亩产可到达2500公斤，而普通的乔化樱桃树苗亩产仅为750公斤。除此之外，经过嫁接伏李子的樱桃比较皮实，好管理，能耐零下27℃的低温。而且由于其独特的矮化技术，这种樱桃树还能够进行盆栽，就能够进一步提升樱桃的价值，使樱桃成为具有观赏性的高档果树。

三、樱桃树不结果怎样办

对不结果的樱桃树可反复摘心，进行叶面喷施植物生长抑制剂如多效唑，可有效控制生长势，促进植株由营养生长向生殖生长转移，从而促进花芽分化。花期可喷施硼砂溶液或者意大利进口的叶面肥--富利硼!或者用以下药剂：1、植物动力20031000倍叶面喷雾;2、0.15%皇嘉天然芸苔素乳油6000-10000倍、科宝植物优生素1500倍混合均匀叶面喷雾解救即可。

总结精选（2）：

樱桃树几年结果一次

1、樱桃树几年结果一次，大樱桃从种植到初次结果一般来说都要三年，如果采用嫁接法这个周期这会缩短一些，其体要根据树木的选取来定的。

2、中国樱桃枝条生根潜力强，大多数都是使用扦插法繁殖，这样让它的成活率一般可达80%~90%。插穗以用一年生枝为宜，于春季树液流动前扦插。插穗长15厘米~20厘米，入土2/3，然后覆土与插穗上口相平或稍高1厘米~2厘米。少量繁殖苗木时可用分株或压条法。甜樱桃须用嫁接法繁殖这样会比较适宜，如果是砧水用草樱桃(为中国樱桃中的一个类型，与甜樱桃的亲合力强)，其他可用青肤樱、酸樱桃和马哈利樱桃。后两种砧木并有必须的矮化作用。

总结精选（3）：

樱桃树几年开花结果？

结果最快的是大樱桃，它从种植到初次结果一般是三年，如果采用嫁接法这个周期会大大缩短，其体要根据砧木的选取。

【相关阅读】

樱桃树蔷薇科梅属落叶小乔木，高可达8m。叶卵形至卵状椭圆形，长7~12cm，先端锐尖，基部圆形，缘有大小不等重锯齿，齿间有腺，上面无毛或微有毛，背面疏生柔毛。花白色，径约1.5~2.5cm，萼筒有毛；3~6朵簇生成总状花序。果近球形，径1~1.5cm，红色。花期3月，先叶开放；果5~6月成熟。我国栽培的樱桃可分为四大类，即中国樱桃、甜樱桃、酸樱桃和毛樱桃，以中国樱桃和甜樱桃为主要栽培对象。

樱桃或樱又名楔荆桃、车厘子等，是某些李属的植物的统称，包括樱桃亚属、酸樱桃亚属、桂樱亚属等。果实能够作为水果食用，色泽鲜艳、晶莹秀丽、红如玛瑙，黄如凝脂，营养个性丰富，果实富含糖、蛋白质、维生素及钙、铁、磷、钾等多种元素。主要产地山东烟台。

中国作为果树栽培的樱桃有中国樱桃、甜樱桃、酸樱桃和毛樱桃。樱桃成熟期早，有早春第一果的美誉，号称“百果第一枝”。据说黄莺个性喜好啄食这种果子，因而名为“莺桃”。其果实虽小如珍珠，但色泽红艳光洁，玲珑如玛瑙宝石一样，味道甘甜而微酸，既可鲜食，又可腌制或作为其他菜肴食品的点缀，备受青睐。

樱桃树蔷薇科梅属落叶小乔木，高可达8m。叶卵形至卵状椭圆形，长7~12cm，先端锐尖，基部圆形，缘有大小不等重锯齿，齿间有腺，上面无毛或微有毛，背面疏生柔毛。花白色，径约1.5~2.5cm，萼筒有毛；3~6朵簇生成总状花序。果近球形，径1~1.5cm，红色。花期4月，先叶开放；果5~6月成熟。

有俗语说：“樱桃好吃树难栽”，其实不是树难栽，就应说是果难摘。樱桃树的适应性相当强，几乎各种土壤都能生长；而且管理技术简便、生长快、收益早，颇能丰产；一棵大樱桃树能结果二、三百公斤，树龄能长达二百余年。但要使樱桃果结的多，质量好，就需要适宜的小气候了。如果栽得不是地方，樱桃树成活没有问题，但有可能终身“不育”——不结樱桃果；天灾和鸟灾也是果难摘的两大难。农谚云：“蚕老一时，樱熟一晌”。樱桃成熟之后，如果不立即收摘，很快会自动落地；若遇上较大的风雨，万颗红珠，便顷刻之间报了销。樱桃熟了，千万只鸟雀云集，若不拼命驱赶和赶快摘收，转眼间树冠就会由红变青，能够一颗樱桃都剩不下，所以说是果难摘。

我国栽培的樱桃可分为四大类，即中国樱桃、甜樱桃、酸樱桃和毛樱桃，以中国樱桃和甜樱桃为主要栽培对象。中国樱桃在我国分布很广，北起辽宁、南至云南、贵州、四川，西至甘肃、新疆均有种植，但以江苏、浙江、山东、北京、河北为多。东北、西北的寒冷地区种植的多为毛樱桃。中国樱桃约有五十多个品种，主要优良品种有浙江诸暨的“短柄樱桃”、山东龙口的“黄玉樱桃”、安徽太和的“金红樱桃”、江苏南京的“垂丝樱桃”、四川的“汉源樱桃”等。此外，还有辽宁、烟台等地引进的个大而甜的欧洲樱桃。但历史比较短，只有一百多年。樱桃树在一年当中，经过萌芽、开花、坐果、落叶、休眠等过程，年年周而复始，每年成为一个年轮，寿命为五十到七十年，高者可达百年以上。每年二月中旬，樱桃花与叶几乎同时萌发。开花后十余天，青青的、小小的球型果实挂满枝头，若逢天气暖热，几场春雨，几日春阳，果实转眼间就红透了。

樱桃扦插：

6月中、下旬选取3-6年生樱桃母树上当年生半木质化嫩枝和硬枝作插条。将枝条剪成12-15厘米长保留3-5节，切口要在距最上一节5厘米处平切，下剪口在节下方1-2厘米处平切，末节叶片摘除，其余保留。然后用ABT1号生根粉浓度为50ppm溶液浸泡其基部30分钟，经处理后生根率高达97%。

樱桃树的管理

一、要注意搭配施肥

樱桃和其它植物一样，在生长发育过程中需要超多的矿质元素，如氮、磷、钾、钙、镁、铁、硼、锌等。缺少这些元素，大樱桃就不能正常生长发育，甚至出现相应的缺素症。

二、病害树处理

对病害树的处理有：①剪除病枝，对局部枝干死亡的病树处理是；同时，将死亡的病枝同方向的根进行清理，将烂根剪掉，涂以复方多菌灵、代森锰锌（均400-600倍）。②清理死树，对因病害而死亡的树进行清理，将树穴土清理出去；同时，扩穴至100cm²、深60cm、填入20cm土杂肥、20cm新土，以备来年重新植树。③检查果树枝干，将果树枝干上的虫卵块清除。

三、树体整枝整形

树体落叶后，树的枝形比较清晰，是整枝整形的理想时期。可根据生产需要，适当地拉枝。同时，将无花芽的内膛、背上枝、交叉枝从根上剪除（剪后涂漆防干缩），待摘果后，结合夏剪，去掉不需保留的内膛、背上枝等。结合根部培土，整好树盆，挖好排水沟。

四、适时浇好春水，及时喷施杀菌剂

近年来，由于冬季降雨雪较少，旱情较重，推荐对果园普浇一遍透水（结合施肥）。隔半月再浇一遍（花前水），既缓解旱情，又降低地温，以利推迟果树开花时间。并及时喷施5度石硫合剂，或1：2.5：200Be多液，对树体进行杀菌消毒。透过“涂白”，也能够较好的减少树体对太阳紫外线的吸收，延缓树体升温过快，以到达推迟开花时间，使盛花期的果树能够处在较适宜的授粉气温环境中，从而提高座果率。

更多资料阅读 请访问 <https://www.xiaorob.com/zhuanti/ziliao/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发